

Eurolac

Gentiaan Violet is een paarse inkt, een effectief middel ter bestrijding van schimmels en bacteriën die huidinfecties veroorzaken, bijvoorbeeld spruw in de mond van de baby, op tepels en tepelhoven, vaginale schimmelinfecties en kalknagels of infecties met stafylokokken op beschadigde en broeierige huid.

In bijgaand flesje zit Gentiaan Violet opgelost in weinig alcohol, vervolgens verdund met 100 delen water (maximaal 0,5% Gentiaan Violet en maximaal 0,5% alcohol). Behandel 1 keer per 24 uur gedurende 3-7 dagen. Indien nodig na een week herhalen.

De inhoud van dit flesje is 10ml. Dit volstaat voor een volledige behandeling van moeder en kind.

Eurolac Lactatiekunde

Haagstraat 6
6447 CJ Merkelbeek

06 204 74 391
www.eurolac.net
info@eurolac.net
KvK 14098467
BTW NL866.70.165.B02
bank 474153452 ABN AMRO
IBLCE nr 392-70032

Eurolac Lactatiekunde

Gebruik

Andere toepassingen

Schoonmaken

Bijwerkingen

Laatst bijgewerkt december 2009

Bijsluiter

Gentiaan Violet

gebruik

In de mond van de baby:

- ◇ Doop een schoon wattenstaafje in de Gentiaan Violet of maak een gevouwen gaasje vochtig (niet doornat) en druppel of spray er wat GV op. Beschilder hiermee de binnenkant van het mondje. Indien meer Gentiaan Violet nodig is een nieuw wattenstaafje of gaasje nemen.
- ◇ Laat het kind **NIET** de GV van het wattenstaafje zuigen!

Op de borst:

- ◇ Maak een gaasje of wattenschijfje vochtig (niet doornat), druppel of spray er wat Gentiaan Violet op, zodat het hele gaasje paars wordt. Beschilder hiermee het hele gebied van tepel en tepelhof dat de baby in het mondje heeft bij het drinken. Indien meer Gentiaan Violet nodig is een nieuw gaasje nemen.
- ◇ Of houd het verstuiverflesje ca 5 à 10cm van de te behandelen plek en spuit een regelmatig dun laagje GV

Andere plaatsen:

- ◇ behandel de besmette plaats ruim met GV op een gaasje of watje of gebruik de verstuiver voor een meer egale verdeling.
- ◇ Bij een inwendige vaginale schimmelinfectie kan een tampon met water licht vochtig worden gemaakt en vervolgens met GV besprayd; Breng de tampon in en haal hem na maximaal een nacht weer weg. 1 maal daags herhalen tot de symptomen verdwenen zijn of maximaal 7 dagen.
- ◇ Babybiljetjes kunnen worden behandeld met GV (watje of spray) en vervolgens met een neutrale zeer vette zalf of met kant en klare GVzalf

andere toepassingen

Verstuiver

Houdt het flesje op 5-10cm van de te behandelen plaats voor het sprayen. Niet met de verstuiver direct in het mondje werken, omdat dan de baby wat van de GV nevel zou kunnen inademen. De GV1% in water in de verstuiver is ook zeer geschikt voor gebruik op andere lichaamsdelen.

Zalf

Gentiaan Violet in een 1% oplossing in vet (lanoline met plantaardige olie). Deze zalf kan dun worden aangebracht op de tepel en tepelhof indien deze als gevolg van de spruw en eventueel gebruik van andere middelen breekbaar en droog is geworden.

Voor babybiljetjes is de GV zalf geschikt om in een dikkere laag te worden aangebracht om zo de schimmel van de lucht af te sluiten en de jeuk te verminderen.

GV zalf is ook geschikt voor schimmelinfecties op andere plaatsen van het lichaam

GVzalf mag drie keer per dag worden aangebracht gedurende 7-8 dagen.

schoonmaken

De paarse verkleuringen van de huid verdwijnen binnen enkele dagen, op huid die geregeld wordt gewassen vaak al binnen een dag. Bescherm kleding tijdens het toepassen. Vlekken in kleding en beddengoed gaan eruit in de kookwas (soms meerdere wasbeurten nodig) of met hulp van alcohol, een vlekoplosser of zuurstofactief middel. Verontreinigde oppervlakten kunnen worden schoongemaakt met alcohol of een zuurstofactief middel.

bijwerkingen

Gentiaan Violet is veilig bij juist gebruik. (1% in water oplossing, niet innemen, niet langer dan 3-7 dagen achtereen gebruiken) Bij mensen met een gevoelige huid kan een lichte irritatie optreden. In dat geval kan het middel 1 op 1 worden verdund met water of het gebruik wordt gestaakt. Bij gebruik van te sterke concentraties, bij langdurig gebruik en bij overdosering kan irritatie van de huid optreden, eventueel met blaren. Inwendig gebruik (slikken) is in **grote, langdurige** doseringen mogelijk kankerverwekkend; dit effect is niet aangetoond bij normaal gebruik op de slijmvliezen in de mond of andere lichaamsdelen.